

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO – IATF COMO OBTER MELHORES RESULTADOS

PARA OBTER UM MELHOR ÍNDICE DE PREENHEZ , COM A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO – IATF, ALGUMAS MEDIDAS SÃO IMPORTANTES:

1 - SELEÇÃO E PREPARO DOS ANIMAIS

- Separar as fêmeas destinadas à IATF dos machos em idade de reprodução, no mínimo 30 dias antes da data marcada para o protocolo inicial. Isso evita aborto de animais prenhes em fase inicial;
- Selecionar novilhas com 11 a 12 arrobas de peso e acima de 18 meses de idade e evitar vacas velhas (acima de 11 anos);
- Destinar vacas para IATF com escore corporal acima de 2,5 (nem magra demais nem gorda demais);
- Administrar um bom sal mineral para vacas em reprodução, pelo menos, 30 dias antes e durante a gestação;
- Não administrar ureia na alimentação durante o procedimento e fase inicial de gestação;
- Vermifugar e combater carrapatos e outros parasitas pelo menos 30 dias antes do início do processo;
- Somente aplicar vacinas 30 dias antes do início do procedimento.



2 - MANEJO NO DIA DOS PROCEDIMENTOS PARA A IATF

- Manejar o gado no dia dos procedimentos com calma, sem agressividade, gritos e cutucões (manejo racional);
- Evitar curral superlotado e longas distâncias para translocar os animais
- Após a chegada das vacas no curral, aguardar no mínimo 30 minutos para que os animais descansem e se acalmem;
- Disponibilizar água no curral de espera para diminuir o estresse calórico.



3 - CUIDADOS PÓS IATF

- Ter pasto e/ou reserva alimentar suficiente para o período de estiagem para sustentar a prenhez;
- Fornecer boa alimentação, sombra e água (o estresse calórico e hídrico afeta diretamente os resultados).

